

Дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердое яблоко, так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто родители идут малышу на уступки - дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не желая того, способствуют задержке у ребенка развития движений артикуляционного аппарата. Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пере-



Как вылечить дизартрию у ребенка

Коррекция дизартрии у детей требует комплексного подхода, сочетающего медикаментозную терапию, логопедическую коррекцию и реабилитацию. Логопедическая коррекция состоит из специальных занятий для детей. Упражнения на: развитие мелкой моторики — пальчиковые игры, гимнастика; развитие артикуляционной моторики — артикуляционная гимнастика, логопедический массаж; развитие речевого и физиологического дыхания — дыхательная гимнастика; коррекцию нарушенного и закрепление правильного произно-



КОУ «Петропавловская школа-интернат»

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАРТРИЯ?

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПУНКТ

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата

Речевые нарушения Дизартрии

- Артикуляторные
- Дыхательные
- Расстройства голосообразования
- Нарушение просодики

A close-up photograph of a young child's face, focusing on the mouth and tongue. The child has light-colored hair and is looking directly at the camera.

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи.



Причинами возникновения дизартрии являются различные вредоносные факторы, которые могут воздействовать внутриутробно во время беременности (вирусные инфекции, токсикозы, патология плаценты), в момент рождения (затяжные или стремительные роды, вызывающие кровоизлияние в мозг младенца) и в раннем возрасте (инфекционные заболевания мозга и мозговых оболочек: менингит, менингоэнцефалит и др.).

Приемы ранней диагностики дизартрии на основе неречевых нарушений:

Дыхание поверхностное, учащенное и аритмичное
Асимметрия лица.
Подтекание молока из одного угла рта..
Отвисание нижней губы,

